

消化管内視鏡検査（生検検査）抗血栓薬休薬リスト

2022年5月更新

（公財）世田谷区保健センター

- 休薬期間とは検査当日を含まない日数を示します。
- 生検を行った場合は、検査前休薬期間と同じ日数を検査後も休薬します。
- 生検を行わなかった場合は、検査終了後に内服を再開します。

2022.7.11更新

	成分名	代表薬品名	検査前休薬期間	検査後休薬期間
抗血小板薬（アスピリン）	アスピリン	アスピリン バイアスピリン バファリン	3日間	3日間
	アスピリン・ランソプラゾール配合	タケルダ		
	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合	キャブピリン		
抗血小板薬（チエノピリジン誘導体）	クロピドグレル硫酸塩	プラビックス	5日間	5日間
	チクロピジン塩酸塩	パナルジン		
	プラスグレル塩酸塩	エフィエント		
	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン配合	コンプラビン		
その他抗血小板薬	チカグレロル	ブリリント	5日間	5日間
	イコサペント酸エチル（EPA）	イコサペントエパデール	1日間	1日間
	オメガ-3脂肪酸エチル（EPA・DHA）	ロトリガ		
	サルポグレラート塩酸塩	アンプラーグ		
	ジピリダモール	ペルサンチン		
	ジラゼプ塩酸塩水和物	コメリアン		
	シロスタゾール	プレタール		
	トラピジル	ロコルナール		
	ベラプロストナトリウム	ケアロードLA ドルナー プロサイリン ベラサスLA		
リマプロストアルファデスク	オパルモン プロレナール			
抗凝固薬	アピキサバン	エリキューズ	1日間	1日間
	エドキサバン	リクシアナ		
	ダビガトラン	プラザキサ		
	リバーロキサバン	イグザレルト		
	ワルファリンカリウム	ワーファリン ワルファリンK		

※抗血栓薬の休薬については、原則、**主治医もしくは処方医の判断**によるものとします。

※当センターでは、通常観察の内視鏡検査（検査医の判断により生検）を行っていますが、生検後の出血リスクを考慮し、『抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン（2012年7月）』（日本消化器内視鏡学会）の「出血高危険度」の休薬期間に準拠しています。

※キャブピリンを追加しました（2022年5月）